

Checkliste zur Reduktion der Sporenbelastung in der Milch

Silieren



- Nur sauberes Grünfutter silieren (keine Maulwurfs-
hügel, Güllereste etc.)
- Nicht zu tief mähen (optimale Schnitthöhe: mehr als
6 cm)
- Kein feuchtes Gras mähen (z. B. nicht im Morgentau)

Fütterung



- Kein verdorbenes Futter
- Kein verschmutztes Futter (Erde)
- Keine Futterbereitung während des Melkens
(Staubentwicklung)
- Ausgewogene Fütterung (Durchfall verhindern)

Tiere



- Saubere Tiere (möglichst keine Verschmutzungen im
Euterbereich)
- Geschorene Tiere inkl. Euter

Umgebung



- Futter- und Tränkebereich sauber halten
- Sauberer und trockener Liegebereich
- Frische Stallluft

Melkanlage



- Zuerst aussen, dann innen reinigen
- Reinigung überprüfen (Wassermenge, -temperatur,
Reinigungsmittelmenge, Turbulenz)
- Kaltwasserschläuche im Milchzimmer und am Reini-
gungsautomaten sowie Euterduschen kontrollieren
und regelmässig ersetzen
- Melkutensilien sauber, trocken und staubfrei lagern
- für die Reinigung der Melkanlage und vom Tränkebe-
reich nur Trinkwasser verwenden

Melkhygiene



- Hände vor und während des Melkens sauber halten
(evtl. Handschuhe)
- Saubere Arbeitskleidung
- Vormelken
- Zitzenreinigung (Einwegmaterial)
- Lufteinbrüche vermeiden
- Nicht unnötig Wasser spritzen während des Melkens
(Sprühnebel)
- Herabfallen der Aggregate verhindern
- Keine anderen Arbeiten während des Melkens