

## Liste de contrôle pour éviter la formation de spores

Contrôlez régulièrement votre production de lait à l'aide de la liste ci-dessous.  
Nous sommes à votre disposition pour toute question.

### Ensilage



- Ensilage uniquement du fourrage vert propre (pas de taupinières, de restes de lisier, etc.)
- Ne pas faucher trop bas (hauteur de coupe optimale : supérieure à 6 cm)
- Ne pas faucher d'herbe humide (p. ex. lorsqu'il y a de la rosée)

### Affouragement



- Pas de fourrage à fermentation suspecte
- Pas de fourrages souillés (terre)
- Ne pas préparer les aliments pendant la traite (dégagement de poussière)
- Alimentation équilibrée (éviter les diarrhées)

### Animaux



- Animaux propres (éviter autant que possible les salissures sur le pis)
- Animaux tondus, pis compris

### Environnement



- Aires d'affouragement et abreuvoirs propres
- Aire de repos propre et sèche
- Air frais dans l'étable

### Installation de traite



- Nettoyer l'extérieur, puis l'intérieur
- Contrôler le nettoyage (quantité d'eau et température, quantité de produit de nettoyage, turbulence)
- Contrôler et remplacer régulièrement les tuyaux d'arrivée d'eau de la chambre à lait des automates de la vache, ainsi que les douchettes pour pis
- Entreposer les ustensiles de traite dans un endroit propre, sec et à l'abri de la poussière

### Hygiène de la traite



- Mains propres avant et pendant la traite (évent. porter des gants)
- Vêtements de travail propres
- Tirer les premiers jets
- Nettoyage des trayons (matériel à usage unique)
- Éviter les aspirations d'air
- Ne pas pulvériser inutilement de l'eau pendant la traite (brouillard)
- Éviter de laisser tomber le faisceau trayeur
- Ne pas effectuer d'autres tâches pendant la traite